

RX Tempi di transito Intestinale

Test diagnostico non invasivo per una valutazione e inquadramento della stipsi cronica da rallentato transito intestinale.

Nel nostro centro viene effettuata la tecnica **a bassa dose di radiazioni** che prevede l'assunzione di markers radiopachi (piccoli cilindretti di 2-3 mm ciascuno) per 6 giorni consecutivi e l'esecuzione di una singola radiografia dell'addome al 7° giorno. Da questa radiografia è possibile l'estrapolazione dei tempi di transito intestinale complessivo e dei vari segmenti colici attraverso formule matematiche.

Dopo aver concordato l'orario e il giorno di esecuzione della radiografia (7° giorno dell'esame).

Iniziare ad assumere 10 cilindretti ogni giorno, per 6 giorni consecutivi antecedenti alla radiografia, sempre alla stessa ora (orario della radiografia), anche durante i pasti, eventualmente mescolandoli con il cibo (un cucchiaino di purea, formaggio stracchino, yogurt, etc). **(non masticare!)**.

In totale verranno assunti 60 markers in 6 giorni.

Il 7° giorno si esegue soltanto la radiografia.

NON è richiesta la sospensione della terapia medica in atto o variazioni della dieta abituale. Tuttavia, nei giorni di esecuzione dell'esame, non bisogna assumere lassativi, effettuare clisteri, né introdurre supposte o assumere farmaci che possono alterare la funzionalità intestinale (per es. oppiacei come codeina, morfina, difenossilato, antistaminici, anticolinergici, antibiotici).

I markers radiopachi (2 bustine da 30 markers) possono essere richiesti presso il nostro centro.

ATTENZIONE: Presentarsi muniti di documentazione clinica e strumentale (pregressi esami RX del colon, colonscopie etc.)