

TAC CON MEZZO DI CONTRASTO

L'Mdc in TAC è a base di IODIO per cui se il paziente ha un comprovato rischio allergico a tale sostanza è necessaria una valutazione del rapporto RISCHIO BENEFICIO da parte del medico curante o dello specialista richiedente con la possibilità di eseguire ugualmente l'esame previa premedicazione.

PREPARAZIONE

IL GIORNO PRIMA DELL'ESAME:

- Seguire una dieta priva di scorie ed evitare cibi che provocano formazione di gas (pane, verdure, patate, legumi, bevande gassate o fermentate).
- Si può mangiare pane biscottato, crackers, riso, carne, pesce

IL GIORNO DELL'ESAME:

- Presentarsi a digiuno da 6 / 8 ore per i cibi solidi e da 2 ore per i liquidi
- PORTARE GLI ESAMI ESEGUITI IN PRECEDENZA RIGUARDANTI L'INDAGINE DA ESEGUIRE

ESAMI DA PORTARE:

Occorre eseguire i seguenti esami (o eseguiti entro 2 mesi): **CREATININA**,

CONTRO INDICAZIONI

Il mezzo di contrasto non può essere somministrato in caso di **allergia conclamata o mieloma**.

PER LE DONNE IN ETA' FERTILE

è indispensabile la consapevolezza **di non essere in stato di gravidanza**, ed è comunque preferibile eseguire l'esame nei primi 10 giorni dall'inizio del ciclo mestruale.

PATOLOGIE O TERAPIE IN CORSO

Possono costituire un problema all'esecuzione dell'esame per cui è necessario chiedere specificatamente al medico anestesista o al medico radiologo esecutore dell'esame:

- Insufficienza renale grave
- **Creatinina** _ a 1,8 mg/dl *per* i maschi e _ a 1,4 mg/dl *per* le femmine
- Insufficienza cardio-vascolare grave
- Diabete
- Anamnesi per Mieloma
- Trattamento in atto con farmaci come: Metformina (DIABETE)
- Comprovato rischio allergico

PROTOCOLLO PER ESECUZIONE ESAMI TAC CON MDC

Servizio di Radiologia via G.B. Custo 11 R 16162 Genova – Bolzaneto -
tel 010.7455063 – radiologia@studiomanara.com

PREMEDICAZIONE

IL SOTTO INDICATO PROTOCOLLO SI APPLICA A SOGGETTI CON SOSPETTA INTOLLERANZA A FARMACI.

secondo il “memorandum della società italiana di allergologia e immunologia clinica per la diagnosi delle intolleranze a farmaci”.

DELTACORTENE FORTE COMPRESSE DA 25 mg.

- 2 compresse 13 ore prima dell'esame
- 2 compresse 7 ore prima dell'esame
- 2 compresse 1 ora prima dell'esame

CLORFENAMINA FIALE

- 1 FIALA I.M. 1 ORA PRIMA DELL'ESAME

N.B.

PRESENTARSI 1 ORA PRIMA DELL'ESAME PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA CLORFENAMINA (TRIMETON 10 mg. f.)

Il Servizio di Radiologia si rende disponibile a lei e al Medico Curante per eventuali ed ulteriori spiegazioni in merito all' esame