

PREPARAZIONE RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO

L'Mdc in Rm è a base di gadolinio e non è e non ha nessuna analogia di principio attivo rispetto alla Tc; la quantità somministrata è ¼ di quella in Tc e non contiene iodio.

L'Mdc in RM è costituito da componenti metalliche per cui l'unica controindicazione è un'alta intolleranza al contatto con metalli ad esempio bigiotteria, bottoni dei jeans...

Non è indispensabile ma preferibile che il paziente abbia con sé le analisi del sangue con esame della creatinina non più vecchia di 3/6 mesi.

Il giorno dell'esame il paziente deve presentarsi a DIGIUNO DA ALMENO 6 ORE e consegnare il MODULO COMPILATO E FIRMATO dal paziente e dal medico curante

Possono costituire un problema all'esecuzione dell'esame per cui è necessario chiedere specificatamente al medico anestesista o al medico radiologo esecutore dell'esame:

- **Creatinina** _a 1,8 mg/dl per i maschi e _a 1,4 mg/dl per le femmine
- Nota allergia ai **Metalli** come bigiotteria, bottoni dei jeans....

PREMEDICAZIONE IN CASO DI NOTA ALLERGIA

Il sotto indicato protocollo si applica a soggetti con sospetta intolleranza a farmaci secondo il "memorandum della società italiana di allergologia e immunologia clinica per la diagnosi delle intolleranze a farmaci"

DELTACORTENE FORTE COMPRESSE DA 25 mg.

- 2 compresse 13 ore prima dell'esame
- 2 compresse 7 ore prima dell'esame
- 2 compresse 1 ora prima dell'esame

CLORFENAMINA FIALE

- 1 FIAL I.M. 1 ORA PRIMA DELL'ESAME

ATTENZIONE: PRESENTARSI 1 ORA PRIMA DELL'ESAME PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLA CLORFENAMINA (TRIMETON 10 mg. f.)

In caso di impossibilità a presentarsi o per ulteriori informazioni telefonare al numero 010/745.50.63 orario segreteria 8.00 –12.00 / 14.00 – 19.00